

# Avertissements agricoles



Bulletin Technique n°2 du 21 mars 1985

**COLZA** : LE CHARANCON DES TIGES ATTEND UN RECHAUFFEMENT !

**OIGNON DE SEMIS** :

**PEPINIERE DE CHOUX** :

**POIS - POIS PROTEAGINEUX** :

LES DESHERBANTS UTILISABLES AVANT  
LA LEVEE


## COLZA

### LE CHARANCON DES TIGES ATTEND UN RECHAUFFEMENT !

Dans la plupart des secteurs alsacien, le vol n'a pas démarré à cause du temps froid.

Des captures n'ont été enregistrées que dans un poste de piégeage du Bas-Rhin : WIWERSHEIM.

Toutefois le vol devrait se généraliser et s'intensifier dès la fin de cette période froide.



Gros charançon de la tige  
(Photo Bonnemaïson)

Quel que soit le secteur, il est donc trop tôt  
pour traiter. Attendez notre prochain bulletin

### LES DESHERBANTS UTILISABLES AVANT LA LEVEE

#### OIGNON DE SEMIS

Deux cas peuvent se présenter :

#### 1. Le sol est apparemment propre :

Pour éviter les levées ultérieures d'adventices, trois spécialités, empêchant la germination des graines sont utilisables :

- RAMROD L (propachlore) : 9,5 l/ha,
- MAFOG (propachlore) : 7,2 kg/ha,
- DACTHAL W 75 (chlorthal) : 12 kg/ha.

Ces produits n'ont une bonne efficacité qu'en conditions humides (pluie ou apport d'eau de 15-20 mm après le traitement).

Imprimerie de la Station de STRASBOURG  
Directeur-Gérant : D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP N° :

Abonnement Annuel 1848 DA

ISSN 0751-154X

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX



ALSACE : (88) 37.32.18

LORRAINE : (8) 337.26.45



## 2. Des adventices ont déjà levé :

Il est nécessaire d'utiliser un herbicide de contact : (NON SELECTIF = A UTILISER AVANT LA LEVEE DE LA CULTURE)

- Réglone 2 (diquat) : 3 l/ha (non efficace sur graminées),
- Gramoxone 2000 (paraquat) : 3 l/ha (efficace sur graminées),
- Priglone 2 (diquat + paraquat) : 3 l/ha

Ces produits n'étant pas persistants, il est souvent intéressant de les

mélanger avec l'un des produits précédemment cités (RAMROD L, MAFOG ou DACTHAL W 75).

### PEPINIERE DE CHOUX

Si vous n'avez pas désherbé avant le semis, vous pouvez appliquer, avant la levée des mauvaises herbes :

- RAMROD L : 9,5 l/ha,
- MAFOG : 7,2 kg/ha,
- DACTHAL 75 : 10 kg/ha,
- LASSO (alachlore) : 6 l/ha.

☆☆☆

## POIS - POIS PROTEAGINEUX

	PRODUIT COMMERCIAL (matière active)	DOSE/HA	ADVENTICES SENSIBLES	OBSERVATIONS
PRE-SEMI	BONALAN (benfluraline)	6 l	Graminées annuelles Gaillet, renouées liseron et des oiseaux, véroniques	Incorporation de 3 à 6 cm dans les 24 heures
POST-SEMI - PRE-LEVEE	TENORAN (chloroxuron)	7 kg (8 kg sol lourd)	Nombreuses dicotylédones annuelles sauf gaillet, lamier, renouées liseron	
	CHANDOR - TERSIPLNE - FERMAX (linuron + trifluraline)	4 à 5 l	Graminées sauf folle-avoine dicotylédones annuelles (dont matricaires, véroniques...)	traiter juste après le semis Le semis doit être profond (3-4 cm) ou bien recouvert de terre. (Moins sélectif du pois d'hiver)
	TRIBUNIL (méthabenzthiazuron)	4 kg	Graminées sauf folle-avoine dicotylédones annuelles sauf gaillet et véroniques.	adapter la dose à la nature du sol
	PHENOTERB (nitrofène + dlnoterbe)	7 à 10 kg	Graminées sauf folle-avoine dicotylédones annuelles sauf gaillet	employer 4 à 5 jours avant la levée des pois. Dose faible dans les sols battants, limoneux et sableux
	HERBALT - HERBALT S (nitrofène + néburon)	7 - 6 kg	Vulpin, paturin, agrostis, folle-avoine en train de lever. Dicotylédones annuelles dont matricaires et véroniques.	
	TRAPAN (pendiméthaline + linuron)	2,5 kg	Graminées sauf folle-avoine dicotylédones annuelles sauf gaillet.	Semis réguliers et bien recouverts. (Moins sélectif des pois d'hiver).
	TREPLIK (pendiméthaline + néburon)	4 kg	Vulpin, agrostis, paturin, dicotylédones annuelles sauf gaillet.	Semis réguliers et bien recouverts. Pois de printemps uniquement.
	IGRANE autosuspensible (terbutryne)	3 à 4 l	Graminées sauf folle-avoine dicotylédones annuelles sauf gaillet, ravenelle et sanve.	Sol humide.